

福建省种子协会

关于推荐农作物优良品种活动的一封信

致各有关单位：

为了满足八闽乡村农民和专业种植合作社、家庭农场选用优良农作物新品种，促进农业增效和农户增收，省种子协会决定继续开展第三届福建省种子协会会员单位的农作物品种展示线上推介活动，为企业和农户间搭起沟通平台。本次活动共有会员企业 13 家参与，推介水稻品种 9 个，蔬菜品种 22 个，其中青梗菜 5 个，松花菜 1 个，花椰菜 2 个，蕃茄 2 个，西瓜 2 个，甜瓜 1 个，甜糯玉米 6 个，苦瓜 2 个，马铃薯 1 个（详见附件水稻篇和蔬菜篇），品种简介附有联系企业联络人及电话，欢迎咨询和购种服务。

福建省种子协会

2023 年 2 月 15 日

一、水稻篇（会员企业 7 家，品种 9 个，排名不分先后）

杂交水稻“玮两优 7713”	
品种审定号：国审稻 20216113	
品种特性：中稻种植，全生育期 136.9 天，株高 131.2 厘米，穗长 25.3 厘米，每亩有效穗数 14.8 万穗，每穗总粒数 221.0 粒，结实率 82.1%，千粒重 27.4 克，整精米率 65.9%，垳白度 0.9%，直链淀粉含量 14.3%，胶稠度 82.0 毫米，碱消值 6.6 级，长宽比 3.0，达到农业行业《食用稻品种品质》标准二级病虫害发生情况，抗褐飞虱，中感稻瘟病，田间病虫害未发或轻发。亩产量 660 公斤，适宜福建省北部稻区稻瘟病轻发区种植。	
亚丰种业：廖留英 13950454964	

杂交水稻“遂两优 9816”	
品种审定号：闽审稻 20220035	
品种特性：晚稻种植，全生育期 127.6 天，与对照宜优 673 相当。株高 116.8 厘米，穗长 25.6 厘米，每亩有效穗 16.3 万，每穗总粒数 147.0 粒，结实率 82.5%，千粒重 28.7 克，糙米率 82.9%，整精米率 61.6%，垟白度 2.6%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 84 毫米，直链淀粉含量 13.3%，米质达部颁二等优质食用稻品种品质标准。中抗稻瘟病，田间病虫害未发或轻发。亩产 650 公斤，适宜福建省晚稻种植。	
栽培要点：6 月中旬前播种，秧龄控制在 25~30 天左右。栽插规格 20 厘米×23 厘米，丛插 1~2 粒谷。亩施纯氮 15 千克，氮、磷、钾比例为 1.0:0.5:1.0，基肥、分蘖肥、穗肥比例为 5：3：2。水管采取深水返青，浅水分蘖，够苗晒田，复水抽穗，湿润灌浆，后期不要断水过早。注意及时防治病虫害。	
亚丰种业：廖留英 13950454964	

杂交水稻“昱香两优馥香占”	
品种审定号：（闽）引种[2022]第 1 号	
品种特性：作晚稻品种，平均生育期 125.3 天，株型适中，剑叶挺直，长势繁茂，分蘖力较强，穗大粒多，结实率较高，熟期转色好，每亩有效穗 18.4 万，株高 109.1 厘米，穗长 25.0 厘米，每穗总粒数 172.7 粒，每穗实粒数 152.1 粒，结实率 88.1%，千粒重 23.2 克，出糙率 81.0%，精米率 72.3%，整精米率 67.6%，粒长 7.0mm，粒型长宽比 4.0，垩白粒率 3%，垩白度 0.5%，直链淀粉含量 16.3%，胶稠度 62mm，碱消值 6.3 级，有香味，米质达部标 1 级；米饭香味浓郁，富有嚼劲，咀嚼时有甜味，冷后不回生，口感好。	
2020 年荣获江西省第二届优质稻品种食味品质鉴评活动金奖。中感稻瘟病，田间病虫害未发或轻发。亩产 579 公斤，适宜福建省稻瘟病轻发区种植。	
亚丰种业：廖留英 13950454964	

杂交水稻“金龙优 607”	
品种审定号：闽审稻 20220041	
品种特性：晚稻品种，全生育期 128.3 天，株高 111.3 厘米，穗长 22.2 厘米，每亩有效穗数 16.4 万，每穗总粒数 182.7 粒，结实率 78.2%，千粒重 24.6 克。糙米率 82.2%，整精米率 60.4%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.3，垩白度 0.9%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 76 毫米，直链淀粉含量 15.8%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准。中抗稻瘟病，适宜福建省晚稻种植。	
栽培要点：6 月上中旬播种，秧田播种量每亩 8 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 25 天以内。栽插株行距 20 厘米×	

20 厘米，每蔸插 2 粒谷秧。科学施肥，亩施纯氮 10~12 千克，氮、磷、钾比例为 1.0: 0.6: 0.8。水管采取“浅水促蘖、适时烤田、有水抽穗、湿润灌浆、后期干湿交替”，收割前 7~10 天断水。注意及时防治病虫害。

中种农业：彭洁 15386486469

杂交水稻“荃优 607”

品种审定号：国审稻 20206150；(闽)引种[2022]第 1 号

品种特性：全生育期 126 天，株高 124.3 厘米，穗长 23.8 厘米，每亩有效穗数 17.1 万穗，每穗总粒数 204.1 粒，结实率 85.9%，千粒重 25.5 克。整精米率 67.0%，垩白度 1.0%，直链淀粉含量 17.8%，胶稠度 66 毫米，碱消值 6.6 级，长宽比 3.1，达到农业行业《食用稻品种品质》标准一级。中感稻瘟病，感白叶枯病，高感褐飞虱，抽穗期耐热性强。亩产 700 公斤，2022 年安徽省水稻新品种展示观摩暨高峰论坛会推荐品种；安徽省优质稻品种食味品质品种鉴评金奖。适宜福建省稻瘟病轻发区作一季中稻种植。



栽培要点：适时播种、培育壮秧，亩用种量 1—1.5 千克，秧龄 25—30 天，大田株行距以 16.7×20 厘米，丛插 2 棵 3 叉秧，亩 2 万丛，有效穗达 18 万左右，采用前促、攻中、保尾的施肥策略。浅水栽秧，寸水活棵，薄水分蘖，够苗及时排水轻搁田，干湿交替，孕穗扬花阶段保持浅水层，成熟前 7—10 天断水，及时防治褐飞虱、稻瘟病、白叶枯病、白叶枯病等病虫害。

中种农业：彭洁 15386486469

杂交水稻 “浙粳优 1578”	
品种审定号：国审稻 20190028；（闽）引种[2018]第 1 号	
品种特性：全生育期 145 天，长势繁茂，株型紧凑，茎秆粗壮，剑叶挺直，植株清秀，耐肥抗倒，穗大粒多，后期转色好。抗稻瘟病，注意防治稻曲病。米质达食用稻部颁三等，稻谷耐储存，克服了粳粳交品种不耐储存、陈化快的缺点。亩产量 945 公斤。	
栽培要点：播种期 4 月 20 日至 6 月 10 日，大田亩用种量 0.75-1 公斤，秧田亩播种量 20 公斤，插足基本苗，保证有效穗，在抽穗前 7-10 天打 1-2 次药预防稻曲病。注意水管，够苗前以浅、露田为主，干湿交替，促发棵，长期泡水（连续 15 天以上）会出现叶片发红，品种穗大粒多，灌浆成熟时间较长，不宜太早断水，待完全成熟后再断水。栽培上增施钾肥，防止缺钾易造成红叶病。	
农丰农业：杨金木 18060853280	

杂交水稻“诚优 13”	
品种审定号：浙审稻 2021016；（闽）引种[2022]第 1 号	
品种特性：全生育期 140 天，株型适中，分蘖力中等，剑叶挺，穗型较大，后期落色好。稻瘟病抗性综合指数 2.13，穗颈瘟损失率最高级别 1 级，室内接种鉴定表现中抗，综合评价中抗稻瘟病，亩产量 780 公斤。	
栽培要点：分蘖力中等，栽培中应当插足基本苗，保证有效穗，适当控氮增施钾肥，早追肥促分蘖，后期慎施氮肥防倒伏；适宜播种期 4 月 20 日至 6 月 10 日，大田亩用种量 0.75~1 千克，机插亩用种量 1.25~1.5 千克，秧田亩播种量 20 千克；秧龄控制在 30 天以内，机插秧秧龄 20 天以内。一般亩插 1.5 万丛，每丛 1~2 本，基本苗 3~4 万，双本插，加强白叶枯病、稻曲病、细条病、螟虫、卷叶螟、稻飞虱等病虫害的防治，破口前 7~10 天预防 1~2 次稻曲病。严禁断水过早，九成熟后适时收割，以防倒伏。	
农丰农业：杨金木 18060853280	

杂立水稻“汇两优 278”	
品种审定号：闽审稻 20220064	
品种特性：全生育期 137 天，株型适中，茎秆粗壮，剑叶挺直，穗大粒多，熟期转色好。每亩有效穗 13.5 万，株高 119.6 厘米，穗长 24.5 厘米，每穗总粒数 214.0 粒，结实率 79.9%，千粒重 28.4 克。糙米率 81.0%，整精米率 59.9%，垩白度 3.4%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 72 毫米，直链淀粉含量 18.9%，米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准。亩产 622 公斤。	
栽培要点：作中稻种植，秧龄为 30 天左右。栽插规格以 23 厘米×23 厘米为宜，丛插 2 粒谷苗。栽培上重施基肥，早施分蘖肥，配施有机肥及磷、钾肥。亩施纯氮 12 公斤，氮、磷、钾比例为 1:0.6:0.9，基肥占施肥总量的 60~70%，促蘖肥占 20%左右，穗粒肥占 10%左右。水管掌握浅水促蘖，后期干湿交替，保根养叶，忌断水过早。注意及时防治病虫害。	
神农大丰：李晨 13365049701	

杂立水稻“旺优 2918”	
品种审定号：闽审稻 20220075	
品种特性：全生育期 122 天，株型适中，分蘖力较强，穗大粒多。每亩有效穗 19.1 万，株高 121.7 厘米，穗长 23.8 厘米，每穗总粒数 168.9 粒，结实率 83.14%，千粒重 23.4 克。糙米率 81.2%，整精米率 68.0%，垩白度 0.4%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 86 毫米，直链淀粉含量 15.9%。米质达部颁三等优质食用稻品种品质标准，亩产 509 公斤，适宜福建省晚稻种植。	
栽培要点：作晚稻种植，6 月上中旬播种，亩用种量 1.0 公斤，秧龄为 25 天左右。插植密度 20 厘米×20 厘米，丛插 2 粒谷苗。亩施纯氮 10 公斤，氮、磷、钾比例为 1.0:0.6:0.9，基肥占施肥总量的 60~70%，促蘖肥占 20~30%，穗粒肥占 10%。	

水管采取浅水促蘖、适时烤田、有水抽穗、湿润灌浆、后期干湿交替。注意及时防治病虫害。
神农大丰： 李晨 13365049701

杂交水稻“菁两优 533”	
品种审定号：闽审稻 20220016	
品种特性：全生育期 132.4 天，株高 110.5 厘米，穗长 23.2 厘米，每亩有效穗数 15.2 万，每穗总粒数 194.4 粒，结实率 85.0%，千粒重 24.5 克。糙米率 81.1%，整精米率 64.0%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.0，垩白度 0.7%，透明度 1 级，碱消值 6.8 级，胶稠度 80 毫米，直链淀粉含量 16.4%。米质达部颁一等优质食用稻品种品质标准，中抗稻瘟病。亩产 630 公斤，适宜福建中稻种植。	
栽培要点：一般 4 月下旬到 5 月上中旬播种，秧田播种量每亩 10 千克，大田亩用种量 1~1.25 千克。水育秧移栽叶龄 5.5 叶左右，秧龄控制在 30 天以内。栽插株行距 19.8 厘米×23.1 厘米，每蔸插 1~2 粒谷秧，每亩插足基本苗 5 万以上。科学施肥，亩施纯氮 10~12 千克，氮、磷、钾比例为 1.0：0.5：0.8，基肥、分蘖肥、穗肥、粒肥比例为 5：3：1：1。常规水分管理，收割前 7~10 天断水。注意防治病虫害。	
科荃种业：廖松林 13515989431	

二、蔬菜篇（会员企业 9 家，品种 22 个，排名不分先后）

不结球白菜“金品 1 夏”	
品种登记号：闽认菜 2013017	
品种特性：生育期 35-50 天，株型直立，叶色亮绿，梗色绿，生长速度快，叶片数多，耐热、耐湿，高温季节不易拔节，口感好，商品性佳，产量高，可大小菜兼用，夏季大菜亩产 2500 公斤，小菜亩产 1500 公斤。适宜在福建 4 月 1 日至 9 月 20 日种植。重点防治炭疽病、黑腐病、霜霉病和蚜虫、菜青虫和小菜蛾。	
金品农业：朱彬 15005903378	

不结球白菜“金品 522”	
品种权号：CNA20180462.7	
品种特性：生育期 35-50 天，株型直立，叶面平展，叶色亮绿，梗色绿，商品性好，耐热性强，高温季节播种不易拔节，抗病性强，高抗炭疽病、软腐病和霜霉病，抗逆性强，不易老化。适宜在福建 3 月 10 日至 11 月 15 日种植。防治炭疽病、黑腐病、霜霉病和蚜虫、菜青虫、小菜蛾。	
金品农业：朱彬 15005903378	

不结球白菜“金品 558”	
品种权号：CNA20170127.5	
品种特性：生育期 40-50 天，生长速度快，叶片数多，叶面平整，叶色亮绿，梗色油绿，束腰性好，较耐抽苔，商品性突出，高抗霜霉病、白锈病等，产量高，冬季可做大小菜兼用，大菜亩产 4000 公斤，小菜亩产 2000 公斤，适宜在福建 9 月 15 日至 11 月 10 日种	

植，防治炭疽病、黑腐病、霜霉病和蚜虫、菜青虫、小菜蛾。	
金品农业：朱彬 15005903378	

大白菜“金品 851 快菜”	
品种认定号：GPD 大白菜（2017）350004	
品种特性：生育期 60 天，株型直立，叶片厚且平整，叶色亮绿，叶帮宽厚，生长速度快，耐热性好，抗病性强，耐雨性较好，商品性突出，易栽培，产量高，夏季栽培的理想品种，亩产量 3000 公斤。适宜在福建 4 月 10 日至 10 月 25 日种植，防治病毒病，霜霉病，软腐病，白锈病和跳甲，蚜虫，菜青虫等。	
金品农业：朱彬 15005903378	

大白菜“金品优选快菜”	
品种认定号：GPD 大白菜（2017）350003	
品种特性：生育期 55-60 天，株型直立，叶色嫩绿，心叶嫩黄包心较早，低温期生长速度快，品质佳，产量高，抗病性好，较耐抽苔，秋季和春季播种的首选品种。适宜在福建冬春季种植，冬季亩产 4000 公斤。防病毒病，霜霉病，软腐病，白锈病和跳甲，蚜虫，菜青虫等。	
金品农业：朱彬 15005903378	

青梗松花“黄金 100”	
品种权号：CNA20201006842	
品种特性：晚熟秋播品种，秋植后 90 天-100 天左右采收，球形高圆，花球金黄色、籽粒中细、花梗浅绿、口感脆甜、单球重 2000 克。适宜在福建 9 月 5 日-10 月 10 日种植，苗龄秋种为 30 天左右，亩栽 1800-2000 株，在生长过程中亩	

施硼砂 20-100 克或者钼酸铵 50 克拌肥施用； 严禁在结球前后施用杀虫双、巴丹、强敌 311 等杀虫剂。	
中厦种业：陈梅珍 13850014291	

花椰菜“中厦松花 80”	
品种登记号：CNA20201006844	
品种特性：生育期秋播 80-85 天，春播 60-65 天， 中晚熟品种，耐寒耐热性适中，抗病抗逆性强， 耐大水大肥，植株强健，生长快速，根系发达， 吸肥力强，容易栽培，在不良环境下能正常生长， 球形圆整，花球松大白美，花梗浅绿，单球重 2000 克左右，秋季定植后 80-85 天左右采收，春播定植 后 60-65 天左右采收，品质好。亩产约 2000-2500 公斤，在福建适宜 9 月 1 日至 11 月 25 日种植。	
中厦种业：陈梅珍 13850014291	

花椰菜“中厦松花 100”	
品种登记号：CNA20201006843	
品种特性：晚熟品种，晚熟品种，耐寒耐湿，定植后 到时采收约 90-100 天，植株高大，生长势旺，根系发 达，生长快速，容易栽培，花球松大，洁白美观，单 球重 2500 克左右，花梗长呈青绿色，成熟整齐，花 球松大。苗龄秋种为 30 天左右，春种 45-50 天，亩栽 1800 株。亩产 3000 公斤，在福建适宜 8 月 25 日至 10 月 20 日种植。	
中厦种业：陈梅珍 13850014291	

蕃茄“中厦316”

品种登记号：闽认菜 2016016

品种特性：全生育期 140-150 天，晚熟型，株型无限半蔓生，生长势强，株高 200 厘米以上，定植至采收 90 天左右，叶片羽状复叶，最大叶长 42-50 厘米，最大叶宽 34-40 厘米，叶片绿色，果形高圆，果色大红，果面特征光滑，果高 5.3-6.0cm，果横径 6.5-7.5cm，果肉颜色红色，单果重 180-210g。杂种优势强、耐寒、抗病性强，果实硬度好，耐贮藏和运输果大果色红亮商品性好，适宜秋季陆地栽培或冬季大棚温室栽培。白粉病、枯萎病等真菌类病害较轻枯萎病，病毒病，防适宜在福建莆田、漳州、龙岩地区：1 月 20 日-3 月 20 日、6 月 20 日-8 月 20 日播种。

中厦种业：陈梅珍 13850014291



小蕃茄“千禧”

品种登记号：GPD 番茄（2018）350165

品种特性：无限生长型樱桃番茄。播种至始收 90 天左右，成熟果桃红色，果形短椭圆形，果纵径 3.9cm 左右，横径 2.5cm 左右，单果质量约 20g，大小整齐，可溶性固形物含量约 10.0%，番茄素含量 0.0665 毫克/克，维生素 C 含量 0.312 毫克/克。果硬，肉质脆爽，风味佳，不易裂果，易采收。产量高，亩产 4000 公斤。耐低温性好，抗 CMV，中抗 TMV，不抗 TYLCV，抗枯萎病，中抗根结线虫。适宜在福建秋季或越冬、早春种植。

农友种苗：陈金龙 13850058818

栽培要点：秋季种植 8—9 月播种，苗龄 30 天左右，双杆整枝，每亩植 1500—1800 株，宜在定植成活后追施叶面硼肥 2 次以上，转入生殖生长期后，适当根外追施钙肥 2—3 次，以提高果实的耐裂性。控制灌溉量，使土壤保持偏干状态，切忌土壤过分湿润。

西瓜“翠玲”	
品种登记号：GPD 西瓜（2017）350145	栽培要点：亩植 500 株，穴盘育苗，苗龄 15-30 天移栽，亩施农家肥 2000kg+复合肥 30kg+过钙 20kg+硼砂 1kg。追肥：用 800 倍液尿素水浇灌，瓜蔓长至 40cm 追施(15:15:15)硫酸钾复合肥 20kg,开花后一周左右追施(15:15:15)硫酸钾复合肥 30kg、氯化钾 20kg,并配合喷药连续使用 500-800 倍磷酸二氢钾叶面肥进行叶面施肥。防治疫病、炭疽病。
品种特性：翠玲生育期 80-90 天，果形椭圆形，单瓜重 3.5 公斤左右，脆爽多汁，中心可溶性固形物约 11-12.1%,皮厚约 0.8-1.0 厘米，皮薄而韧，耐贮运。翠玲早熟，生长势强，结果力强，春季从播种至始收 80-90 天左右。从座果至采收春季 28-35 天、夏秋 25-30 天。瓜中心可溶性固形物约 11-12.1%,皮厚约 0.8-1.0 厘米，皮薄而韧，耐贮运。抗逆性：耐低温、弱光性较好，中抗枯萎病。亩产量 3600 公斤，福建春作 2-3 月，秋作 8 月。	
农友种苗：陈金龙 13850058818	

西瓜“惠玲”	
品种登记号：GPD 西瓜（2018）350572	栽培要点：亩植 500 株，穴盘育苗，苗龄 15-30 天移栽，亩施农家肥 2000kg+复合肥 30kg+过钙 20kg+硼砂 1kg。追肥：用 800 倍液尿素水浇灌，瓜蔓长至 40cm 追施(15:15:15)硫酸钾复合肥 20kg,开花后一周左右追施(15:15:15)硫酸钾复合肥 30kg、氯化钾 20kg,并配合喷药连续使用 500-800 倍磷酸二氢钾叶面肥进行叶面施肥。防治疫病、炭疽病。
品种特性：翠玲生育期 85 天，小型西瓜，中早熟种，生长势强，结果力强，主蔓第 6~7 节着生第一朵雌花。果形椭圆形，瓜纵径约 24 厘米，瓜横径约 16 厘米，瓜重 3.0 千克左右，瓜皮淡绿色，有绿色细条纹，果肉红色，细脆多汁，中心可溶性固形物约 12%,边可溶性固形物约 8.6%,瓜皮厚约 0.8 厘米，皮薄而韧，耐贮运。抗逆性：较耐低温、弱光，中抗枯萎病。亩产量 3500 公斤，福建适宜 2 月中旬至 7 月中旬种植。	
农友种苗：陈金龙 13850058818	

甜瓜“美浓”	
品种登记号： GPD 甜瓜（2017）350063	栽培要点： 亩植 500—600 株，吊蔓栽培密度每 667m ² 栽植 1800—2000 株。每 667m ² 基施优质农家肥 2000kg,磷酸二铵 10kg,尿素 5kg,硫酸钾 20kg,地爬栽培留 3—5 条条子蔓，每株留瓜 5—6 个，吊蔓栽培采用单蔓整枝，孙蔓结瓜，每株留瓜 3-4 个。及时授粉,瓜未坐稳时要适当控制水分。果实鸡蛋大小时每 667m ² 追高钾施肥 (N-P-K 为 13-13-25)20kg。果实成熟前 5-7 天不浇水，并适时采收。
品种特性： 薄皮甜瓜杂交种，中早熟品种，生长势强，分枝性好，雌花发生早，坐果率高，全生育期 70—90 天，果实成熟期 25—32 天。果实梨形，大小整齐幼果为绿色，成熟时果皮呈淡黄色，单果重通常在 500—600g 之间。果肉淡白绿色，中心可溶性固形物含量 16—18%,香味浓，质地细嫩甜美。美浓除了适合露地地爬粗放栽培之外，也适合温网室吊蔓栽培。中抗白粉病，中抗霜霉病。产量 1600 公斤（爬地）。适宜福建春季种植。	
农友种苗： 陈金龙 13850058818	

甜玉米“永珍七号”	
品种审定号： 闽审玉 2016001;桂审玉 2016011 号；皖玉 2016041	栽培要点： 育苗种植，畦带沟 1.2 米，每亩 2800-3000 株。重施基肥、注重提苗肥和追施拔节肥。生育期内防止田间积水，大水漫灌后及时排干。病虫害防治方面用，可喷施多菌灵和农用链霉素等药剂预防茎腐病，代森锰锌可湿粉剂、三唑酮可湿粉剂等药剂预防小斑病和纹枯病，大喇叭口期喷施 Bt 粉、甲基阿维菌素等药剂预防玉米螟和蚜虫。授粉后 20-25 天，采收的最佳时期。适采期甜玉米穗顶籽粒饱满，花丝变黑并开始枯萎，顶端的苞叶开始变松软。
品种特性： 生育期(出苗到采青) 84 天，芽鞘、颖壳绿色，花药淡黄色，花丝绿色，黄籽白轴。株型平展，平均株高 232.6cm，穗位高 103.7cm。穗筒型，穗长 21.7cm，穗粗 5.0cm，籽粒排列整齐，穗行数 14.8，行粒数 40.3 粒，鲜百粒重 38.2g，出籽率约 70.5%。抗大斑病、抗小斑病、高抗锈病、高抗茎腐病、高抗粗缩病、抗玉米螟、纹枯病接菌鉴定为中抗，亩产 1260 公斤。福建闽南地区春季适宜 1 月下旬至 3 月上旬播种，秋季 8 月下旬至 9 月下旬份播种，闽北地区 3 月至 8 月份均可播种。	
超大种业： 徐福乐 13509324852	

甜玉米“双甜 2018”	
品种审定号：国审玉 20200498；闽审玉 20200004；黑审玉 20220040；浙审玉 2022003	栽培要点：露地春播 4 月上旬-5 月中旬，保护地 3 月下旬，秋播 6 月下旬 7 月下旬；亩植 3500—4000 株。选择中等以上肥力地块，采用高畦、等行栽培方式。重施基肥（种肥）和大喇叭口肥（攻苞肥），适宜施苗肥、拔节肥和壮粒肥（穗肥）。亩施有机肥 1000 公斤，复合肥 50 公斤，氯化钾 25 公斤，过磷酸钙 100 公斤。视苗期长势情况，可在拔节期、喇叭口期亩追施尿素 10-15 公斤。植株生长前期，以中小水灌水为主；抽雄穗前后需水量大，需浇足水；灌浆期以中水灌溉为宜。
品种特性：出苗至鲜穗采收期 67.85 天，幼苗叶鞘绿色，叶片绿色，叶缘绿色，花药黄色，颖壳绿色。株型平展，株高 186.1 厘米，穗位高 55.34 厘米，成株叶片数 13 片。果穗短筒型，穗长 17.35 厘米，穗行数 14-20 行，穗粗 4.75 厘米，穗轴白，籽粒花色、马齿，百粒重 34.85 克。果穗穗行排列整齐，长籽粒型，穗轴细，出籽率高；籽粒黄白相间，色亮美观；皮薄、渣少、汁多、质脆、甜度高，可直接生吃，风味佳，综合品质优良。接种鉴定，高抗/中抗丝黑穗病，感小斑病，感瘤黑粉病，高感矮花叶病。亩产 985 公斤，适合福建春夏秋种植。荣获 2022 年参加浙江·长三角鲜食玉米品种大会甜玉米组金奖。	
超大种业：徐福乐 13509324852	

糯玉米“万农甜糯 158”	
品种审定号：国审玉 20220538 号；桂审玉 2020048 号	栽培要点：春季地温稳定在 12℃ 以上播种，亩植 3000 株，亩施过磷酸钙 30~50kg, 氯化钾 20~30kg, 尿素 25~30kg。磷钾肥在播种前作一次性基肥施用。苗期、拔节期和大喇叭口期分 3 次施用氮肥。玉米苗期怕涝，注意排水。大喇叭口期及抽雄前 10 天、花后 2 天，田间持水量保持在 70% 以上。苗期防治地下害虫；在大喇叭口期至花期防治玉米螟、小菜蛾等。春季采收期在吐丝后 22~24 天，秋季
品种特性：出苗至鲜穗采收 88 天，幼苗叶鞘紫色，花丝浅绿色，花药紫色，颖壳紫色。株型半紧凑，株高 206 厘米，穗位高 78 厘米，成株叶片数 16 片。果穗长锥形，穗长 19.1 厘米，穗行数 14-16 行，穗轴白色，籽粒白色，糯质，鲜百粒重 38.2 克。感丝黑穗病，感纹枯病，中抗小斑病，外观品质和蒸煮品质 86.0 分。亩产 916 公斤，荣获 2020 中国北京鲜食玉米大会“全	

国十大优秀甜加糯玉米品种”。	采收期在吐丝后 24~26 天。
万农高科：欧阳振华 15859445346	

甜玉米“双萃 270”	
品种审定号：国审玉 20220579	栽培要点：应当选择土壤肥力高、排水好、土质疏松的田块，精细整地，施足底肥。育苗移栽，加强苗期管理促早发。春播地膜覆盖栽培，亩植 3000 株，综合中耕除草及时去分蘖，注意防治小班病和纹枯病。该品种属早熟品种，生产期间肥水管理须及时，6-7 叶追拔节肥，大喇叭口期追施攻穗肥。授粉期间如遇连续阴雨天，人工辅助授粉，以免结实不良降低果穗品质，慎用除草剂。
品种特性：亚热带鲜食甜玉米品种，属于早熟品种，春播出苗至鲜穗采收 81.2 天，整齐度好，叶色浓绿，抗倒性较强。株高 202 厘米，穗位高 62 厘米，穗长 20.8 厘米，穗粗 4.6-5.5 厘米，穗行数 14-16 行。单苞鲜重 400-450 克，鲜百粒重 46.5 克，抗病性接种鉴定高感丝黑穗病，感纹枯病，中抗小班病。亩产 1300 公斤，适合福建春季种植。	
福州金苗种业：胡建清 18065153335	

甜糯玉米“雪甜糯 321”	
品种审定号：闽审玉 20220008	栽培要点：应当选择土壤肥力高、排水好、土质疏松的田块，精细整地，施足底肥。育苗移栽，加强苗期管理促早发。春播地膜覆盖栽培，亩植 3000 株，综合中耕除草及时去分蘖，注意防治小班病和纹枯病。该品种属早熟品种，生产期间肥水管理须及时，6-7 叶追拔节肥，大喇叭口期追施攻穗肥。授粉期间如遇连续阴雨天，人工辅助授粉，以免结实不良降低果穗品质，慎用除草剂。
品种特性：鲜食甜加糯玉米品种。春播出苗至鲜穗采收 81.5 天，平均株高 223.8 厘米，穗位高 88.0 厘米，穗长 19.3 厘米，穗粗 5.2 厘米。果穗均匀，长锥型，苞叶浓绿，籽粒白亮有光泽，甜糯粒比约 1:3，亩产 1400 公斤，荣获福建省种子协会举办的“人保财险杯”2022 年秋季鲜食玉米竞赛活动中荣获“糯（甜）玉米组金奖”。	
福州金苗种业：胡建清 18065153335	

甜玉米“荟甜8号”	
品种审定号：闽省玉 20220003；（粤）引种〔2022〕第2号	栽培要点：春播3月中旬至4月中旬。春季土壤温度稳定在12℃以上播种，播种深度3-5厘米，足墒下种。与其它玉米采取空间或时间隔离，防止串粉。亩种植密度3200~3500株。春播多雨注意排水。施足基肥，以有机肥和复合肥为主，底肥亩施氮磷钾复合肥30~35公斤。拔节期结合中耕培土增施尿素10公斤、复合肥15公斤。大喇叭口期后增施尿素10公斤、复合肥10公斤。开花前后增施钾肥，亩用量10公斤。
品种特性：春播出苗至鲜穗采收80天，幼苗叶鞘绿色，叶片绿色，颖壳绿色，花药绿色，花丝绿色。株型半紧凑，平均株高225.8厘米，穗位高71.1厘米，果穗长筒型，穗长20.5厘米，穗粗5.7厘米，秃尖长0.2厘米，穗行数15.5行，行粒数38.7粒，黄粒白轴，鲜百粒重42.2克，出籽率67.6%。倒伏率0.0%，倒折率0.1%。品质分析：皮渣率11.9%，可溶性总糖21.6%，还原糖8.0%。外观及品尝鉴定87.7分。亩产1500公斤，适宜福建春秋种植。	
科荟种业：胡昌泉 13705938048	

苦瓜“奇胜105”	
品种认定号：闽认菜 2016004	
品种特性：生长周期150天，中早熟品种，蔓生，植株生长强健，抗病性强，耐热性好。雌花率高，连续座果、连续采收能力强，主蔓第一雌花着生于第13-18节，正季栽培从开花到商品瓜成熟约15-18天。果皮白绿色，有光泽，中长筒状，果肩平，圆粒瘤间短纵瘤，商品外观美，耐贮运。座果后，果实膨大迅速，适时采收瓜长约28-32cm，瓜径约7-8cm，肉厚约1.3cm，单果重0.6-0.8kg。肉质脆嫩，苦味适中，品质佳，亩产3300公斤。适合福建春季或越夏种植。	
福建田美种业：李洪龙 13805006170	

苦瓜“奇胜 308”	
品种认定号：闽认菜 2016005	
品种特性：生长周期 180 天，属于中早熟优秀品种，果皮翠绿色有光泽，短纵瘤与圆粒瘤相间，长棒形，果长约 33-38 厘米，横径 7-9 厘米，肉厚约 1.5 厘米，果硬，单瓜重 500-800 克，抗病、耐湿、耐高温，耐贮藏，商品性好，品质优。做越夏和延迟采收为主。亩产 7000 斤以上。适宜在福建春季或越夏种植。 栽培要点：选土层深厚、肥力强、排灌水便利的土地。定植前应深耕土壤、施足底肥，座果后加强水肥管理。安排栽培密度，及时修剪病中、老叶、弱小无雌花的枝蔓及发育不良的畸形瓜，及时采收商品瓜。加强水肥管理、防止植株退肥早衰是提高果实商品性、保证产量的关键。防白粉病、霜霉病以及瓜实蝇和瓜螟。	
福建田美种业：李洪龙 13805006170	

马铃薯“闽诚 2 号”	
品种登记号：GDP 马铃薯（2020）350080	
品种特性：生育期 86 天，株型直立，平均株高 46.0 厘米，主茎数 2~3 条，分枝少，匍匐茎短，叶片椭圆形，叶片绿色，茎绿带褐色；块茎为椭圆形，薯皮淡黄色，薯肉淡黄色，表皮光滑，芽眼深度中等；平均单株结薯 5.2 个，单株薯重 0.42 千克，结薯集中，薯块整齐，商品薯率 80.7%。干物质 17.65%，淀粉 13.4%，蛋白质 2.1%，粗脂肪 0.57%，维生素 C 含量 172 毫克/千克，还原糖 0.54%，口感较好。中感晚疫病，中抗病毒病。产量可达 2500 千克，适宜福建冬春季种植。 栽培要点：将脱毒种薯切成 30~35 克小块，杀菌剂拌种。亩植 4000~4500 株/亩。种植规格：垄宽(带沟)120 厘米，垄高 30~40 厘米，每垄双行种植，行	

距 35 厘米，穴距 23~25 厘米。施肥时宜“攻头、保中、控尾”，基肥每亩 800 千克有机肥和 75 千克复合肥作。追肥：亩施用复合肥 100 千克左右，中后期及时喷施叶面肥。防治蚜虫、叶蝉等虫害，中后期主要防治晚疫病、青枯病等病害。	
闽诚公司：黄青 15860815189	